

**CLAVE PARA DETERMINAR LAS ESPECIES MÁS COMUNES DE
MACRURA CHILENOS**
(Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Instituto de Zoología,
Curso: ZOLL-204, Carlos Jara)

- 1 (2) Basipodio de los pereiópodos siempre libre, no fusionado al isquipodio; articulación carpo-propodo con un solo punto articular; pleópodos nadadores, salvo los sexual.....3
- 2 (1) Basipodio de los pereiópodos soldado al isquipodio, al menos en los pereiópodos anteriores; articulación carpopropodo con al menos dos puntos articulares; pleópodos nunca nadadores..... 15
- 3 (4) Pleuras del 2º segmento abdominal no se sobreponen a las del 1er y 3er segmentos. Pereiópodo 3º quelado PENAEIDEA.....
.....*Haliporoides diomedeeae* (Faxon)
- 4 (3) Pleuras del 2º segmento abdominal se sobreponen a las del 1er y 3er segmentos. Pereiópodos del 3º no quelado..... CARIDEA
.....5
- 5 (6) Rostro móvil en el plano vertical, articulado sobre el caparazón, su margen ventral dentado y su longitud equivalente a la del cefalotórax
.....*Rhynchocinetes typus* M-Edw.
- 6 (5) Rostro inmóvil, fusionado al caparazón.....7
- 7 (8) Rostro presente.....9
- 8 (7) Rostro ausente.....*Betaeus* sp.
- 9 (12) Rostro corto, no sobrepasa el artículo basal de las anténulas; quela del quelípodo mayormente modificada en instrumento sonoro "disparados"..... 10
- 10 (11) Con tres espinas frontales.....*Synalpheus spinifrons* (M-Edw)
- 11 (10) Con una espina frontal y dos laterales mucho más pequeñas.....
.....*Alpheus chilensis* Coutiere